

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL GLUCAGON INTRANASAL (GI)

¿Por qué necesito usarlo?	- El glucagón debe usarse para elevar los niveles de azúcar (glucosa) que estén peligrosamente bajos. - El glucagón eleva los niveles de glucosa estimulando la liberación de glucógeno del hígado y los músculos. - Este producto está diseñado para ser administrado por la nariz.
¿Cuándo necesito usarlo?	- En caso de que su hij@ tenga un nivel de glucosa muy bajo y esté inconsciente, no pueda tragar o esté convulsionando. - Esta forma de glucagón se puede administrar incluso con secreción o congestión nasal. - Puede usarse en cualquier persona mayor de 4 años. - Nunca retire la envoltura del producto hasta que necesite utilizarlo .
<u>Nunca retire la envoltura del producto hasta que necesite utilizarlo</u>	
¿Cómo dosificarlo / administrarlo?	- Retire la envoltura tirando de la tirita roja. - Abra la tapa y retire el dispositivo del tubo. - Sostenga el dispositivo entre los dedos y el pulgar. - Inserte suavemente la punta de este en la fosa nasal hasta que los dedos toquen el exterior de la nariz. - Presione el émbolo firmemente hasta el final (no contra la nariz). - La administración se ha completado cuando desaparece la línea verde. - Llame al 911 inmediatamente después de la administración del glucagón intranasal.
<u>Llame al 911 inmediatamente después de la administración del glucagón intranasal</u>	
¿Qué esperar después de su administración?	- Ponga a su hij@ de lado en caso de vómito. - Si el niñ@ no responde luego de 15 minutos, se puede administrar otra dosis; esperar ayuda de emergencia.

	- Cuando el niñ@ esté alerta, fomente la ingesta de alimentos lo antes posible. ○ ½ taza de jugo/refresco regular o 1 tubo de gel de glucosa. - Cuando esté completamente despierto, dele un refrigerio más grande sin importar el nivel de azúcar en la sangre. • 1 paquete de galletas de queso o mantequilla de maní. • ½ sándwich + ½ taza de leche. - Revise el nivel de glucosa de su hij@ por lo menos cada 4-6 horas en las próximas 24 horas. - Esté atento a los "picos de rebote" y más niveles bajos de glucosa. - Haga que su hij@ coma todas las comidas y meriendas como de costumbre y tenga como meta una glucosa de 150-200 mg/dl durante los próximos 2-3 días para reponer las reservas de glucógeno del hígado. - Llame al consultorio de su médico para informar el uso de glucagón intranasal, para ajustar la dosis de insulina (si es necesario) y para obtener una nueva receta. - Esté atento a los efectos secundarios del glucagón que incluyen malestar estomacal, náuseas o vómitos. - Si es necesario, favor siga las recomendaciones sobre de "Limpiar cetonas" en su paquete de diabetes.
DESECHE EL ENVASE DE GLUCAGÓN DESPUÉS DE SU USO.	
PARA LLAMADAS URGENTES, llame al número de emergencia de su Clínica de Diabetes _____	



Copyright © 2025 Pediatric Endocrine Society. The information provided by the Pediatric Endocrine Society (PES) is for educational purposes only and is not intended to replace professional medical advice, diagnosis, or treatment. Patients should always seek the advice of their physician or other qualified healthcare provider with any questions regarding a medical condition or treatment. Clinicians should use their independent clinical judgment in the context of individual patient circumstances. The PES does not endorse any specific tests, products, or treatment protocols mentioned in these materials.